


Tratar Derrames Cerebrales

Medicamentos Anti-coágulos/Antitromboticos (“Diluentes de Sangre”)

- Previenen que se formen o que se crezcan los coágulos
- No pueden disolver un coágulo que ya se ha formado
- Los efectos secundarios incluyen: moretones, malestar estomacal, hemorragias gingivales cuando se cepilla los dientes, falta de apetito, tos, y voz ronca
 - Use un cepillo de dientes con cerdas suaves y una máquina de afeitar eléctrica para reducir el riesgo de sangrado



Medicamentos Antiagregantes Plaquetarios

- Previenen la formación de coágulos por reducir la adherencia de la sangre
- Son recetados generalmente para pacientes que han sufrido un infarto, derrame, o remplazo de un stent

Informe a su médico o enfermera si usted ha sufrido uno de lo siguientes:

- Sangre en su orina o excremento
- Cefaleas o dolor intenso repentino
- Mareo, cambios en la visión, confusión, habla de forma incoherente, o debilidad en un lado
- Reporte sangrado no normal, moretones severos, síntomas u otras preocupaciones

Coumadina (Warfarina)

- Fármaco diluyente de sangre que disminuye la posibilidad que se forman coágulos sanguíneos
- Tome Coumadina tal como fue indicado
- No cambie su dieta ni deje de tomar otras medicinas si no lo indique su doctor
- Asegúrese que obtenga instrucciones especiales en cuanto a lo que puede o no puede comer porque la vitamina K dietética puede afectar los niveles de warfarina en la sangre
- Llame a su médico si tiene uno de los siguientes efectos secundarios: hemorragia gingival, moretones, hemorragias nasales, heces de color rojo o negro, y orina de color rosado o marón
- Otros diluentes de sangre disponibles: Xarelto and Pradaxa
 - Cada uno tiene sus precauciones específicas
 - Consulte con su doctor o enfermera para información sobre estos fármacos